

Cuidados del Yeso:

- Si se produce picazón no debe introducir objetos (palillos) no utilice cremas o talco, para aliviar soplé con aire frío de un secador de pelo.



- El yeso solo se debe retirar bajo indicación médica, nunca lo haga usted ya que se necesita personal debidamente entrenado y herramientas adecuadas.



- observe que la movilidad, sensibilidad, temperatura y color de su extremidad sea igual que en el resto de su cuerpo, si presenta mucho dolor consulte en un SAR o urgencia.



Contactate con
nosotros.
¡Resolveremos tus
dudas!

CONTACTO



www.hospitaltraumatologico.cl



coordinadorpoliclinicohtc@ssconcepcion.cl



41-3270068




San Martín 1580, Concepción



Hospital Traumatológico
de Concepción


cuidados de yesos



Box de Yeso Unidad de
Policlínico

Pasos para su atención

- posterior al control médico, debe entregar su documento al guardia del policlinico.
- nuestro guardia se encargara de entregar el documento en el box de yeso, mientras usted espera su atención en la sala de espera.
- su turno para ser atendido es por orden de llegada, y será llamado por altoparlante.
- recuerde que cada yeso es hecho a medida de cada paciente, por lo que los tiempos de atención pueden variar.



Tipos de yeso



el yeso confeccionado se calienta, por lo que se recomienda **NO** secar con aire caliente para evitar quemaduras.

- Yeso bota larga



- inmoviliza tobillo, pie y parte inferior de la pierna, permitiendo que se mejoren fracturas en estas areas, asi como lesiones tendinosas



- Rodillera de yeso

- mantiene la rodilla en una posicion fija, evitando empeorar lesiones como fracturas, esguinces o lesion de ligamentos.



- Yeso bota corta

- inmoviliza tobillo, pie ademas evita que se aumenten las lesiones en estas areas como en los metatarsos.



- Yeso braquial corto

- Inmoviliza lesiones de fracturas en codo o humero distal, ademas de proteger lesiones de ligamentos en el sector



- Yeso braquiopalmar

- indicado tambien como el yeso braquial corto pero ademas se suma la inmovilizacion para fracturas de extremo distal del radio



- Yeso ante braquiopalmar

- indicado en fracturas de muñeca y tambien en fracturas de metacarpos y carpos.

Cuidados del Yeso:

- Deje que su yeso se seque, este proceso demora 48 horas, evite apoyarlo sobre superficies duras para evitar deformidades



- Mantenga su extremidad en alto para evitar que esta se inflame, realice movimientos con los dedos.



- No moje su yeso, para realizar su aseo diario debe envolver este en una bolsa plastica.

